


โรคพิวหนังเนื้อชา

สาเหตุ

โรคพิวหนังเนื้อชา หรือโรคเรือนเป็นโรคติดต่อเรื้อรัง เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ชื่อ มัยโคแบคทีเรียม เลเปร (Mycobacterium leprae)



การติดต่อ


โรคเรือนติดต่อได้โดยการอាចอยู่ใกล้ชิดสัมผัสคลุกคลีกับผู้ป่วยที่มีเชื้อมาเป็นเวลานาน และได้หายใจเข้าเชื้อโรคนี้ที่โลยกันในอากาศเข้าสู่ร่างกาย แต่คนที่ไม่ไปมากกว่าร้อยละ 95 จะมีภูมิต้านทานตามธรรมชาติต่อโรคเรือนอยู่แล้ว ซึ่งถ้าได้รับเชื้อโรคก็จะไม่ป่วยเป็นโรคภูมิต้านทานของร่างกายจะกำจัดเชื้อออกไปเอง



อาการ

เชื้อโรคเรือนจะทำลายเส้นประสาทส่วนปลายและผิวหนัง

โรคเรือนในระยะเริ่มแรก เป็นโรคเรือนชนิดเชื้อน้อยจะพบเป็นผื่นสีขาวหรือสีแดง ผิวผื่นแห้งชา ถ้าไม่ได้รับการรักษา โรคจะทวีความรุนแรงขึ้น เป็นโรคเรือนชนิดเชื้อมาก ผู้ป่วยจะมีผื่นนูนแดงหรือดุมแดงหัวตัวไม่คันเส้นประสาทถูกทำลายทำให้มีอาการ มือเท้าชา กล้ามเนื้ออ่อนแรง



การรักษา

โรคเรือนรักษาให้หายขาดได้ด้วยยารับประทานผ่านเข้าไปในโรคเรือน โดยต้องรักษาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน ถึง 2 ปี และแต่ความรุนแรงของโรค ความพิการมีอยู่เท้าชา กล้ามเนื้อลีบอ่อนแรง สามารถรักษาให้หายด้วยยารับประทานและการทำกายภาพบำบัดแต่ต้องรับมาตั้งแต่ภายใน 1 ปี หลังจากเริ่มมีอาการ



โรคเรือน

การดูแลตัวเอง

แผนที่สถาบันโรคผิวหนัง



สถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

การป้องกัน

สามารถลดและป้องกันการแพร่กระจายติดต่อของเชื้อโรคเรื้อน โดยช่วยกันแนะนำให้ผู้ป่วยรีบไปรับการรักษาแต่เนิ่นๆ และครบร่าง แนะนำให้ผู้ที่มีอาการสงสัยเป็นโรคเรื้อนให้รีบไปพบแพทย์

อาการทางผิวหนังที่นำไปสู่เป็นโรคเรื้อน ได้แก่

- ผื่นขาวหรือผื่นแดง เรื้อรังเกิน 3 เดือน
- ผื่นขาวหรือแดงชา หายกไม่เจ็บ ไม่คัน ไม่ปวด
- มือเท้าชา
- กล้ามเนื้อมือเท้าลีบอ่อนแรง
- ปวดตามเล้านประสาทของแขนขา



รถประจำทางที่ผ่านหน้าสถาบันโรคผิวหนัง
สาย 8, 12, 14, 18, 28, 92, 97, 108, 116
ปอ. 509, 510, 515, 524, ปอ.ว. 4, 8

งานสุขศึกษาและเผยแพร่
สถาบันโรคผิวหนัง

420/7 ถนนรามวิถี แขวงกรุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร : 02 354 8036 - 40 โทรสาร : 02 354 8042

โรคผิวหนังเนื้อชา

www.inderm.go.th