


ភ្លាមីផែជាន់ចាំ

Atopic Dermatitis

សាខាពិភ័យ

រូបិយោធាពាហ៉ាងបានត្រួតពិនិត្យការងារដែលបានរៀបចំឡើងទៅសម្រាប់ប្រើប្រាស់។ ក្នុងការងារនេះ គឺជាប្រព័ន្ធផ្លូវការណ៍ដែលបានរៀបចំឡើងទៅសម្រាប់ប្រើប្រាស់។ ក្នុងការងារនេះ គឺជាប្រព័ន្ធផ្លូវការណ៍ដែលបានរៀបចំឡើងទៅសម្រាប់ប្រើប្រាស់។



סורה

โกรกนี้คือน้ำงาจะมีรูปแบบเดียวกัน สังเกตได้ง่ายโดยที่มักจะมีผิวแห้งและคัน มีผื่นผิวน้ำอักเสบในแต่ละบริเวณของร่างกาย ในแต่ละช่วงอายุตั้งแต่

1. ช่วงอายุ 2 เดือน - 2 ปี มีผื่นผิวหนังอักเสบบริเวณแก้ม, หน้าผาก ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการเสียดสีในช่วงที่เด็กยังคงคุกคาม แต่บางคนอาจมีเพียงแค่รอยด่างขาวๆ ที่แก้ม เรียกว่ากลากหน้าม อาการผิวแห้งคันกระตุนให้เด็กเกา แต่อย่างเด็กการอักเสบยิ่งมากขึ้น จะหมายความว่าอาจมีการติดเชื้อที่ผิวหนังด้วย

2. ช่วงอายุ 4-10 ปี รายผิดหนัง
อักเสบจะเลื่อนไปสู่ตำแหน่งของข้อพับ
บริเวณแขนและขา, ข้อพับเข่า ข้อพับ,
ข้อศอก, ซึ่งมีอัตราที่ต้องห้าม เกินต้น
พื้นจะเป็นทึ่งแข็งขี้แข็งขี้ยกราก แพทย์ราม
รุนแรงของอาการอักเสบอาจไม่เท่ากัน
ทางร้ายค่าจะมีผิวหนังเป็นที่หนาตัวสีน้ำ
เงินเป็นและหันมาก พองพันช่วงนี้แล้ว ส่วนใหญ่จะค่อยๆ ดีขึ้น
และหายไป เหลือแต่อาการผิวแห้ง

3. ช่วงอายุ 12 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่จะมีอาการผิดเพี้ยง ทัน และแพ้จ่าย บ้าๆ 亂ๆ และคนมองตีพอก็จะบรรเทาอาการต่างๆ ให้มาก มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่เป็นภัยเสีย หรือปั้งคุณค่า และมักจะหลีกเลี่ยงบริเวณไฟมือ ฝ่าเท้า บางรายมีอุเทราเรือง จนมีเดือดออกหิบฯ และจะแพ้สารต่างๆ ได้ง่าย เพราะเป็นวัยที่ต้องสัมผัสกับสิ่งต่างๆ มากที่สุด โดยเฉพาะสารเคมีที่เกี่ยวกับเรื่องความร้อน



การรักษา

ยังไม่มีวิธีรักษาให้หายขาดได้แต่ไม่ติดต่อ โรคนี้ถ่ายทอดทางพันธุกรรม วิธีที่จะช่วยลดอาการและความรุนแรงของโรค คือรักษาและปฏิบัตินี้อุบัติ

รายงานและสรุปประจำปี

๘๖๗

ยาสเดียรรอยด์ ทางรีเวนเน่นดันหัวลง 2 ครั้ง ให้ยาที่มีความเข้มข้นต่ำกว่ารีเวนไปหน้า ข้อพับ รักแร้ ขาหนีบ และในเต็กลิ่ก เมื่อถืออาภารตี้ขึ้น ควรหยุดยกหัวที่

ยาโพร์ไหพิด ออยเมเนท์แลกอีลิเตลครีม ทาที่รอยไว้
กันละ 2 หนึ่ง เฟ้า - เม็น อาการทึบและผื่นจะดีขึ้นเร็ว ยานี้จะช่วย
ลดลงเรื่อยๆ เช่นเดียวกับการใช้ยาต้มของชาตัวเดียว

สารเรียนภาษาไทย

ยาแก้แพ้ ร้ายแรงดอกร้าวซัน เมื่อใช้ร่วมกับยาชาจะทำให้เพิ่ม
หายเร็วขึ้น

ยาปฏิชีวนะ ในผู้ไข้ที่มีภาวะติดเชื้อแบคทีเรียทั้งหมด การใช้ยาปฏิชีวนะร่วมกับยาแก้อักเสบจะทำ จึงทำให้ผู้ไข้ดีขึ้นโดยรวม ต่อการรักษาดีขึ้น



การดูแลตนเอง

1. สังเกตว่าแพ้อะไรก็ให้หลีกเลี่ยงสิ่งนั้น เช่น นม, ไข่, อาหารทะเล
2. ควรเลือกใช้สบู่ให้ความชุ่มชื้น ไม่ระคายเคืองกับผิว หลังอาบน้ำควรทาโลชัน หรือครีมให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว หลีกเลี่ยงสิ่งที่ได้รับเชื้อ เช่น ยาสูบ น้ำหอม และเครื่องประดับ ที่มีการดูดซึ�บเข้าสู่ผิว
3. ควรอดิภัยเดือด้า เครื่องใช้ และสิ่งที่กระตุ้นอาการ ต่างๆ เช่น ผ้าขนหนู, สัตว์เลี้ยง ควรใช้ผ้าฝ้าย มีการดูดซึ่บเข้าสู่ผิว สะอาดที่ห้องน้ำและเครื่องนอนอยู่เสมอ เพื่อขจัดและป้องกันไวรัส
4. หลีกเลี่ยงการทาสีกนเกราะ กาว กาวกันน้ำ เช่น การทาเนื้อรักมาก หรือกาวแม่เป็นต้น
5. ลักษณะของผิวจะเปลี่ยนไป เป็นผิวแห้ง ขาดน้ำ ขาดไขมัน ขาดสารต้านอนุมูลอิสระ
6. การรักษาในระยะเรื้อรัง ต้องใช้ยาทาร์หรือวินิฟิล์ม ที่ควบคุมการปล่อยน้ำ ให้ความชุ่มชื้นทั่วทั้งผิว
7. ควรป้องกันโดยการหลีกเลี่ยง เช่น ห้องน้ำ ห้องนอน อย่าต้องอยู่ในห้องน้ำ หรือห้องนอนในขณะที่มีอากาศดี จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผิวน้ำเสียหาย และต้องรักษาตัว

แผนที่สถาบันโรคพิวหนัง



รถประจำทางที่ผ่านหน้าสถาบันโรคพิวหนัง
สาย 8, 12, 14, 18, 28, 92, 97, 108, 116

ปอ. 509, 510, 515, 524, 1 กอ พ 4, 8

Atopic Dermatitis

ภูมิแพ้ผิวน้ำ

Atopic Dermatitis



งานสุขศึกษาและเผยแพร่
สถาบันโรคพิวหนัง
420/7 ถนนราชวิถี แขวงปทุมวัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2364 8036-40 โทรสาร : 0 2364 8042
www.inderm.go.th

สถาบันโรคพิวหนัง
กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข